

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

everX Flow™

SHORT-FIBRE REINFORCED FLOWABLE COMPOSITE FOR DENTIN REPLACEMENT

Use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS FOR USE
everX Flow is a reinforcing dentin replacement material suitable for:
1. All direct composite restorations including large posterior cavities, deep cavities and end-treated teeth, cavities with missing cusps or after amalgam removal and cavities where inlays and onlays would also be recommended.

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE
1. Preparation
a) Hold the syringe upright and remove the cap by turning counterclockwise.

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! DE

everX Flow™

MIT KURZEN GLASFASERN VERSTÄRKTES FLOWABLE COMPOSITE FÜR DENTINERSATZ

Nur durch zahnmedizinisches Fachpersonal für die beschriebenen Indikationen anzuwenden.

INDIKATIONEN
everX Flow ist ein verstärkendes Dentinersatzmaterial geeignet für:
1. Alle direkten Kompositrestaurationen einschließlich großer Seilenzahnkavitäten, tiefer Kavitäten und endodontisch behandelte Zähne, Kavitäten mit fehlenden Höckern oder nach der Amalgamierung, sowie Kavitäten für weiche Inlays und Onlays empfohlen werden.

KONTRAINDIKATIONEN
1. Direkte Pulpaüberkappung
2. Dieses Produkt darf nicht bei Patienten verwendet werden, die eine Allergie gegen Methylmethacrylat monomer oder Methylmethacrylat polymer haben.

DIREKTIONS FÜR DIE VERWENDUNG
1. Vorbereitung
a) Halten Sie die Spritze aufrecht und entfernen Sie die Kappe durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. FR

everX Flow™

COMPOSITE FLUIDE RENFORCÉ EN FIBRES COURTES POUR REMPLACEMENT DENTINAIRE

Utilisation seulement par un professionnel de l'Art dentaire et selon les recommandations indiquées.

MODE D'EMPLOI
everX Flow est un substitut dentinaire qui convient pour:
1. Toutes les restaurations composites directes, y compris les larges cavités postérieures, les cavités profondes et les dents traitées en endo, les cavités avec cuspidés manquants ou après un retrait d'amalgams, ainsi que les cavités où les inlays et les onlays seraient également recommandés.

CONTRE-INDICATIONS
1. Coléage pulpaire direct
2. Éviter d'utiliser ces produits chez des patients présentant une allergie connue aux monomères ou polymères méthacrylates.

DIRECTIONS D'EMPLOI
1. Préparation
a) Tenir la seringue verticalement et retirer le capuchon en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'un montre.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. IT

everX Flow™

COMPOSITO FLUIDO SOSTITUITIVO DELLA DENTINA. RINFORZATO CON BREVI FIBRE

Useo esclusivamente professionale odontoiatrica nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI PER L'USO
everX Flow è un materiale sostitutivo della dentina adatto per:
1. Tutti le restaurazioni composte dirette, comprese le grandi cavità trattate endodonticamente, cavità con cuspidi mancanti oppure dopo la rimozione dell'amalgama e cavità dove sono raccomandati inlay e onlay.

CONTRINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Operazioni preliminari
a) Tenere la siringa in posizione verticale e togliere il cappuccio ruotandola in senso orario.

Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones de uso. ES

everX Flow™

COMPOSITE FLUIDO REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO CORTAS PARA SUSTITUCIÓN DE DENTINA

Para uso exclusivamente profesional en las indicaciones recomendadas.

INSTRUCCIONES DE USO
everX Flow es un material reforzado para sustitución de dentina de gran similitud con las restauraciones de composites dentinales.
1. Todas las restauraciones directas, incluyendo cavidades posteriores de gran amplitud, cavidades profundas, dientes tratados endodónticamente, pérdidas de cúspides o total remoción de amalgam, cavidades en las que restauraciones tipo onlay e inlays también podrían estar indicadas.

CONTRAINDICACIONES
1. Recubrimiento directo a la pulpa
2. Evitar utilizar este producto en pacientes con alergias conocidas a monómeros de metacrilato o polímeros de metacrilato.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Preparaciones
a) Mantener la jeringa en posición vertical y retirar la tapa girando el capuchón protector de la luz en sentido horario.

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. NL

everX Flow™

KORTE ZEVELVERSTERKTE FLOWABLE COMPOSITOET VOOR VERVANGING VAN DENTINE

Aleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door handgeleid gekwalificeerden.

INDICATIES
everX Flow is een vezelversterkt dentine vervingend materiaal geschikt voor:
1. Alle directe compositestaalrestauraties met inbegrip van grote oppervlakte-caviteiten, diepe caviteiten en endodontisch behandelde elementen, caviteiten met ontbrekende knobels of na amalgamverwijdering in caviteiten waar inlays en onlays ook zouden worden aanbevolen.

CONTRA-INDICATIES
1. Directe pulpoverkapping
2. Het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor methacrylat monomeer of methacrylat polymer.

CONTRA-INDICACIONES
1. Recubrimiento directo a la pulpa
2. Evitar utilizar este producto en pacientes con alergias conocidas a monómeros de metacrilato o polímeros de metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

CONTRAINDICAZIONI
1. Incapsulamento diretto della polpa
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.



